

口腔助理医师工作报告总结 助理医师工作报告

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。报告的格式和要求是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

口腔助理医师工作报告总结 助理医师工作报告篇一

尊敬的各位领导、同事们：

大家晚上好！

我是xxxx,应聘的岗位是内儿科岗位。

首先，我非常之感谢许院长、庞副院长、余主任为了我们这次竞聘上岗的机会牺牲了许多作息时间以及做出了大量的精心工作和准备工作。

本人于20xx年xxx医学院，临床医学专科毕业□20xx年-20xx年8月在xxx市第一人民医院实习,后于20xx年9月份来到xxx中心卫生院，在外科跟随xxx□xxx师长参与临床救治业务工作。于20xx年2月份服从院部领导安排，参加院部办公室文印工作。转眼间在这里工作以有3年多。

在这些年来，我本着尊敬领导，尊敬师长，爱岗敬业，团结同事，帮助同事，全心全意为人民服务的精神，服从领导，虚心向师长学习，为医院作出贡献。认真打好每一张出生证，做好每次领导嘱托的每项工作，保守院部秘密□20xx年、20xx年出生证报废率分别为、，均为浦北县全县最低值，获得卫生局检查组肯定和好评。工作之余经常帮助b超室、化

验室、财务室、妇幼办公室的同事处理电脑故障,能够与同事们和谐相处。

如果我竞聘成功:

下面是我的工作思路,请各位领导、同事们批评指正。

1、加强医务人员的思想教育
医生竞聘述职报告,转变服务观念,改善服务态度。

开展多层次的职业道德思想教育,让大家认识到,随着医疗市场竞争的日趋激烈,病人对医院和医生的选择自由度将越来越大,病人可以没有你这一间医院,但我们医院却不能没有病人,增强了大家的危机感和竞争意识,转变观念,变病人求我服务为我主动为病人服务。

使大家树立起服务至上、病人第一的思想,坚持以病人为中心,真正做到诊治一个病人、奉献一份爱心、结交一个朋友
医生竞聘演讲稿3篇
医生竞聘演讲稿3篇。围绕一切为了病人、一切方便病人、一切服务于病人的宗旨,想病人之所想,不断推出便民利民为民的措施,千方百计把方便让给病人,把实惠送给病人。

2、提高法律意识,规范职业行为

随着人民群众维权意识的不断增强,医疗投诉也日益增多。

《关于医疗事故处理条例》的颁布,使医务人员面临严峻的医疗形势的考验。因此,必须教育医务人员增强法律意识,严守职业道德。做到一切医疗行为必须严格遵守操作规程,避免医疗差错事故、减少医疗纠纷发生。

以身作则,言传身教,起表率作用。严格落实医院的规章制度,做到职责明确,责任到位。采取有效措施,保证医德监督到位。把医德医风纳入科室综合目标管理,作为考核评癣

评聘职称、奖金分配的硬指标。设立投诉电话、医德医风意见箱，使医疗行为置于病人和社会舆论监督之中。建立有效激励机制，质优则酬优，质优则评优，从正面激励了医务人员的自觉性。

口腔助理医师工作报告总结 助理医师工作报告篇二

在社会的各个领域，我们都离不开试题，试题是命题者根据一定的考核需要编写出来的。你知道什么样的试题才是规范的吗？以下是小编为大家整理的执业医师《口腔助理医师》考试题及答案，希望对大家有所帮助！

1. 哪一人群不会患龋病

a. 出生1个月的婴儿

b. 出生8个月的婴儿

c. 6岁左右的儿童

d. 16岁左右的青少年

e. 30岁左右的中年男性

正确答案:a

a. 因漏查造成的误差

b. 因检查技术不规范造成的误差

c. 因机遇造成的误差

d.调查对象的代表性很差造成的误差

e.检查者由某种原因造成的误差

正确答案:c

3. 玻璃离子封闭后1年的龋发生率较低，其原因是

a.可释放氟到牙釉质和牙本质并为其吸收

b.硬度大不易破碎

c.黏性大不易脱落

d.具有抑制致龋菌的作用

e.以上均是原因

正确答案:a

4. 定期x线检查属于牙周病预防的

a.一级预防中的促进健康

b.一级预防中的特殊性保护措施

c.二级预防中的早期诊断治疗

d.二级预防中的防止功能障碍

e.三级预防中的康复

正确答案:c

5. 口腔健康教育任务不包括

- a.提高社会人群口腔预防保健的知识水平
- b.采取各种口腔预防措施如窝沟封闭
- c.深化口腔健康教育内容
- d.引起社会各方人员对口腔健康问题的关注
- e.争取领导的支持，传递最新的科学信息

正确答案:b

6. 健康教育属于牙周病预防的

- a.一级预防中的促进健康
- b.一级预防中的特殊性保护措施
- c.二级预防中的早期诊断治疗
- d.二级预防中的防止功能障碍
- e.三级预防中的康复

正确答案:a

7. 口腔癌警告标志哪项是错误的

- a.口腔内溃疡2周以上尚未愈合
- b.口腔黏膜有白色、红色和发暗的斑

- c.口腔与颈部有不正常的肿胀和淋巴结肿大
- d.口腔反复出血，出血原因不明
- e.面部、口腔、咽部等因拔牙而出现麻木与疼痛

正确答案:e

8. 第二恒磨牙最适宜窝沟封闭年龄是

- a.6~7岁
- b.7~8岁
- c.8~9岁
- d.10~11岁
- e.11~13岁

正确答案:e

9. 下列哪项属于牙周疾病二级预防

- a.建立良好的口腔习惯
- b.掌握正确的刷牙方法
- c.口腔健康教育和指导
- d.恢复失牙，重建功能
- e.去除促进牙周病发展的刺激因素

正确答案:e

10. 窝沟封闭对早期窝沟龋的影响是

- a.酸蚀过程本身可使窝沟中的细菌减少
- b.封闭剂杜绝了细菌从口腔环境中获得营养供应
- c.使生存的总细菌中产酸菌少于3%
- d.早期窝沟龋封闭后大部分龋损有龋活跃性转变为静止龋
- e.以上各方面均产生影响

正确答案:e

11. 机体氟排泄的主要途径是

- a.肠道
- b.肾脏
- c.肾脏和肠道
- d.汗液和肾脏
- e.汗液

正确答案:b

12. 窝沟封闭清洁牙面操作方法哪项是错误的

- a.用低速手机上锥形小毛刷蘸上清洁剂刷洗牙面

- b.清洁剂可以用浮石粉或不含氟牙膏
- c.也可用含有油质的清洁剂
- d.彻底冲洗牙面后应漱口
- e.用尖锐探针清除窝沟中残余的清洁剂

正确答案:c

- a.横断面研究
- b.纵向研究
- c.常规资料分析
- d.病例-对照研究
- e.群组研究

正确答案:c

14. 纠正不良习惯属于牙周病预防的

- a.一级预防中的促进健康
- b.一级预防中的特殊性保护措施
- c.二级预防中的早期诊断治疗
- d.二级预防中的防止功能障碍
- e.三级预防中的康复

正确答案:b

15. 过量氟造成机体损害的途径是

b.作为全身性原浆毒抑制酶的活性

c.与神经活动所需的钙结合

d.导致高血钾症引发心脏中毒

e.以上均是引起损害的途径

正确答案:e

16. 牙周病患者在使用牙线前应首先进行

a.刷牙

b.漱口

c.牙签去除菌斑

d.龈上洁治和根面平整

e.牙龈按摩

正确答案:d

17. 正确保管牙刷的方法是

a.刷牙后牙刷要用清水多次清洗

b.将刷毛上的水分甩干

- c.牙刷应每人一把，以避免交叉感染
- d.不能用沸水浸泡或煮沸法消毒，刷毛卷曲应及时更换
- e.上述措施均正确

正确答案:e

18. 下列预防性树脂充填操作中哪项是错误的

- a.用手机去除龋坏组织，去除悬浮釉柱，作预防性扩展
- b.彻底冲洗，干燥，隔湿
- c.c型酸蚀用 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 垫底
- d.酸蚀合面及窝洞
- e.用适当的树脂材料料充填，固化后在合面涂布一层封闭剂

正确答案:a

19. 在口腔医疗保健中经由空气传播的疾病是

- a.淋病
- b.梅毒
- c.结核
- d.破伤风
- e.铜绿假单胞菌化脓感染

正确答案:c

20. 下列流行病学研究方法中不属于描述性流行病学的是

- a.常规资料分析
- b.病例对照研究
- c.横断面研究
- d.纵向研究
- e.以上都是

正确答案:b

口腔助理医师工作报告总结 助理医师工作报告篇三

1、在胚胎的面部生长发育中，以下描述错误的是

- a.面部是由额突和第一腮弓共同生长发育而成的
- c.上颌突与下颌突融合后，一部分形成颊部，剩余部分形成口腔
- d.上切牙部分的硬腭由口窝发育而来
- e.上唇人中由中鼻突生长发育而形成

正确答案□d

答案解析：口窝形成未来的口腔。上切牙部分的硬腭、颌骨

前部分以及上唇人中均由中鼻突生长发育而来。

2、以下哪项疾病可引起口腔黏膜色素沉着

a.缺铁性贫血

b.血小板减少性紫癜

c.原发性慢性肾上腺皮质功能减退

d.维生素c缺乏症

e.糖尿病

正确答案□c

答案解析：色素沉着是原发性慢性肾上腺皮质功能减退早期症状之一，也是最具特征性的表现。色素沉着散见于皮肤和黏膜内，为青铜色、褐色或黑褐色。口腔黏膜色素沉着常发生在唇红、颊、牙龈、舌缘和舌尖等部位。色素过度沉着是黑素细胞活性增加的结果，而细胞数目并不增多。

3、为了获得较好的固位力，患牙制备时各轴面向切方聚合至多不超过

a.5°

b.2°

c.7°

d.8°

e.6°

正确答案□a

答案解析：为了获得较好的固位力，患牙轴壁制备出 2° 、 5° 的牙合向聚合角，当聚合角超过 5° 时，固位力急骤下降。

- a.正中牙合有早接触
- b.基托组织面有倒凹
- c.基托组织面有瘤子
- d.取印模时有托盘压痕
- e.牙槽嵴上有骨突

正确答案□a

答案解析：分析疼痛原因时应鉴别疼痛是由义齿组织面局部压迫造成的还是由于咬合因素使义齿移动而摩擦造成的。大范围、连续性压痛多因咬合因素引起。其余选项均是组织面局部压迫因素。

5、脱位后牙再植之后的治疗方案不正确的是

- a.全身使用抗生素至少1周
- b.3□4周内避免咬合力
- c.若牙根未发育完成，应密切复诊观察牙根发育
- d.若牙根发育完成，2周后拔髓行牙胶充填
- e.复诊时间间隔可随着观察的推移而变长

正确答案□d

- a.患者父亲或母亲的面型也可能是凹面型
- b.患者反牙合是由于幼时使用奶瓶喂养的不良姿势引起的
- c.患者父亲或母亲的面型也一定是凹面型
- d.患者父亲或母亲的面型不一定是凹面型，但前牙一定是反牙合
- e.患者反牙合的形成，是由于幼儿可能存在的其他口腔不良习惯引起的

正确答案□a

答案解析：该题目的目的是考察考生对影响生长发育的两大因素(遗传因素和环境因素)的理解。颅面部错牙合畸形的形成是由于生长发育偏离正常轨迹而造成的，而影响正常生长发育有遗传和环境两大因素。第一个选项考虑到了错牙合牙畸形可能存在的遗传因素的影响。第三个选项则将遗传因素的影响绝对化。事实上，小孩是凹面型，其父母亲可能是正常的。小孩的凹面型可能是由于后天不良的环境因素(如幼时不良喂奶姿势或口腔不良习惯等)造成的。第四个选项对遗传现象的推断也是片面的，事实上父母的前牙也不一定是反牙合。第二个和第五个选项都只顾及后天环境因素对正常生活的影响。

7、单侧下第二乳磨牙缺失，第一恒磨牙未萌出采用何种间隙保持器

- a.远中导板间隙保持器
- b.带环丝圈式间隙保持器

c.全冠丝圈式间隙保持器

d.舌弓式间隙保持器

e.可摘功能性间隙保持器

正确答案□a

答案解析：远中导板间隙保持器适于：第二乳磨牙早失、第一恒磨牙尚未萌出或萌出中；带环丝圈式间隙保持器适于基牙健全，离替牙时间短的情况；全冠丝圈式间隙保持器适于：单侧第一乳磨牙早失、第一恒磨牙萌出后，第二乳磨牙单侧早期丧失、双侧乳磨牙早失用其他间隙保持器装置困难的病例；舌弓式间隙保持器适于两侧第二乳磨牙或第一恒磨牙存在的病例、因乳磨牙早失而近期内侧方牙即可萌出者、因适时拔除第二乳磨牙并需对其间隙进行保持时、两侧多个牙齿早失，使用活动式间隙保持器患儿不合作；可摘功能性间隙保持器适于乳磨牙缺失两个以上者，或两侧磨牙缺失，或伴有前牙缺失。

8、牙本质发育不全的是

a.特纳牙

b.壳状牙

c.哈钦森牙

d.诞生牙

e.氟牙症

正确答案□b

答案解析：特纳牙是指由于乳牙根尖周严重感染导致继承恒牙釉质发育不全，最先由特纳(turner)发现。壳状牙是牙本质发育不全的一种类型，其釉质发育正常，牙本质菲薄，罩牙本质形成后牙本质停止生成，使牙齿呈空壳状。哈钦森牙是指先天性梅毒牙，在胚胎发育后期和出生后第1年内，牙胚受梅毒螺旋体侵害而造成的牙釉质和牙本质发育不全。诞生牙是乳牙早萌的一种表现，指婴儿出生时口内已有牙齿。氟牙症是慢性氟中毒所导致的釉质发育异常，与釉质发育不全不同，其原因明确，发生于多个牙，而釉质发育不全原因尚不清楚，多发生于单个牙或一组牙。

9、以下不是切除性骨手术的适应证的是

- a.牙槽骨峰圆钝、肥厚
- b.一壁骨下袋
- c.二壁骨下袋
- d.三壁骨下袋
- e.邻面骨凹坑状吸收

正确答案□d

答案解析：骨缺损的形态决定着所应采用的手术方法。三壁骨袋尤其是窄而深的骨袋，能成功地用新附着和骨再生方法治疗；一壁骨袋和宽而浅的二壁骨袋，植入的骨或骨替代材料难以固位、成活和形成新附着性愈合，因此通常需用骨成形术来修整牙槽骨的外形，以消除骨袋。

10、关于过敏反应的描述中不正确的是

- a.应用极少量的药物后即出现严重的类似中毒反应的症状

- b.也可以在麻醉的药物注射数小时后出现
- c.故在使用利多卡因前要进行皮肤过敏试验
- d.应立即给以脱敏剂
- e.重症者必要时行气管切开辅助呼吸

正确答案□c

答案解析：一般防止过敏反应的办法是术前询问病史，有过敏史者或超敏体质的患者尽量不选用普鲁卡因作为麻醉的药物，可选用利多卡因或阿替卡因。因为利多卡因和阿替卡因极少发生严重的过敏反应，故使用前不需行过敏试验。

口腔助理医师工作报告总结 助理医师工作报告篇四

3. 考试机构或组织须设考试引导员，负责引导考生进入每个考站和传递考生评分册，保证考试秩序和纪律。

(二) 考试机构或组织器材配置口腔类：

(2) 口腔设备及专用器械和物品：

- 1) 口腔综合治疗台、颅骨/仿生头模型及下颌骨模型；
- 3) 正常离体磨牙；
- 4) 牙髓活力测试结果报告单□x线片(牙片及正常全口曲面断层片)及读片灯箱、实验室检验结果报告单。

(3) 医学教学模拟人，需符合吸氧、人工呼吸、胸外心脏按压

等操作需要。

(4) 计算机多媒体演示：计算机、打印机。

(一) 考试实施的. 基本要求

4. 每位考生必须在同一考试机构或组织进行测试；

6. 医师资格实践技能考试过程中，不得对人体进行创伤性操作；

7. 在体格检查和基本操作采用2名考生相互操作时，要男女考生分开，并至少为女考生安排1名女考官。

(二) 考官担任医师资格实践技能考试的考官，应符合《中华人民共和国卫生部令》第4号第四章第十九条、第二十条、第二十一条规定。在同一考试机构或组织的各考站的考官原则上不能来自同一单位(医院)。

口腔助理医师工作报告总结 助理医师工作报告篇五

2017口腔助理医师考试《预防口腔医学》模拟题（附答案）

一、题型□a1

题号： 1

在口腔医疗保健中，可能由接触和呼吸传播的主要疾病不包括

与hiv感染

b.白色念珠菌感染

c.乙型肝炎

d.结核

e.梅毒

正确答案□ b

答案解析：口腔医疗保健中可能经由接触和空气传播的主要疾病包括□hiv感染与adis□乙型肝炎、结核、梅毒等，白色念珠菌感染是条件致病，不是传播性疾病。

题号： 2

口腔科医生操作中最易感染的是

a.真菌

b.病毒

c.细菌

d.原虫

e.以上都是

正确答案□ b

答案解析：口腔医生操作过程中最易感染的是病毒

题号： 3

对口腔科医生最危险的是

a. 疱疹

b. 肠炎

c. 痢疾

d. 乙肝

e. 脑炎

正确答案□ d

答案解析：对口腔科医生最危险的是乙型肝炎

题号： 4

口腔科医生受感染的途径中没有

a. 器械刺伤皮肤

b. 操作后不洗手

c. 空气消毒不严

d. 食物消毒不严

e. 接触病人血液和唾液

正确答案□ d

答案解析：传播途径主要有：经污染器械伤害传播、经术者手部伤口传播、空气飞溅传播。

题号： 5

口腔科感染控制的最突出问题

- a.是对控制感染的正确估价
- b.对消毒灭菌原理知之不多
- c.对制度执行不严
- d.消毒灭菌缺少严格分类
- e.手机头消毒较困难

正确答案□ a

题号： 6

在伤口缝合处微生物只要达到多少个以上就能感染

- a.50个
- b.100个
- c.200个
- d.500个
- e.1000个

正确答案□ b

题号： 7

乙肝经皮肤传播的途径没有

- a.血液
- b.污染的针头
- c.性接触
- d.针灸
- e.手术

正确答案[] c

题号： 8

在口腔临床工作中，医务人员被感染的主要途径包括

- a.经污染器械伤害感染
- b.经术者手部伤口感染
- c.空气飞溅感染
- d.a+b+c
- e.以上都不包括在内

正确答案[] d

题号： 9

口腔医生比护士感染hbv的危险性大是因为

- a.医生需向病人询问病史

- b.医生与病人之间的距离小
- c.医生经常与患者的唾液接触
- d.医生经常与病人握手
- e.医生自身抵抗力差

正确答案□ c

题号： 10

口腔科医务人员的良好的个人防护屏障不包括

- a.手套，口罩
- b.橡皮障
- c.护眼镜
- d.临床防护衣
- e.铅围裙

正确答案□ e

答案解析：铅围裙是针对辐射污染而准备的，口腔操作当中没有必要用铅围裙。

题号： 11

口腔科医生个人防护不包括

- a.手套

- b.口罩
- c.紫外线消毒
- d.临床防护衣
- e.护目镜

正确答案□ c

题号： 12

供选用的洗手消毒液没有

- a.煤酚皂溶液
- b.乙醇溶液
- c.洗必泰溶液
- d.过氧乙酸溶液
- e.次氯酸钠溶液

正确答案□ a

题号： 13

美国疾病控制中心(cdc)推荐的表面消毒剂是

- a.碘伏溶液
- b.次氯酸钠溶液

c.戊二醛溶液

d.过氧乙酸溶液

e.洗必泰溶液

正确答案□ b

题号： 14

常用的灭菌方法中有

a.高压蒸汽

b.化学熏蒸

c.干热灭菌

d.消毒液冲洗

e.以上都是

正确答案□ e

题号： 15

氯己定漱口液使用浓度为0.12%和

a.0.1%

b.0.2%

c.0.3%

d.0.4%

e.0.5%

正确答案□ b

题号： 16

口腔科医生操作时最易感染

a.乙肝

b.感冒

c.肺炎

d.疱疹

e.白血病

正确答案□ a

答案解析：口腔科医生最危险的是病毒感染，其中乙肝是最容易感染的病毒。

题号： 17

口腔科主要的感染途径是

a.空气

b.治疗器械

c.漱口水

d.血液和唾液

e.皮肤接触

正确答案□ d

答案解析：口腔科主要是通过血液和唾液感染。

题号： 18

牙科常用的灭菌方法中没有

a.高压蒸气

b.化学熏蒸

c.干热灭菌

d.玻璃球/盐

e.液体浸泡

正确答案□ e

二、题型□a2

题号： 1

a.看病人前后洗手

b.紫外线消毒空气

c.手术器械高压灭菌

d.机头的消毒

e.个人的防护

正确答案□ d

题号： 2

a.经呼吸道

b.经消化道

c.经皮肤途径

d.经飞沫途径

e.以上都不是

正确答案□ e

题号： 3

a.经呼吸道

b.经性行为

c.经消化道

d.经皮肤途径

e.以上都不是

正确答案□ b

题号： 4

低□hiv高

高□hiv低

和hiv都高

和hiv都低

和hiv都时高时低

正确答案□ a

题号： 5

a.要求每位病人洗手

b.医生上班前消毒液洗手

c.护士每天要消毒物品

d.消毒液擦洗诊椅

e.严格控制感染的制度

正确答案□ e

题号： 6

a.更换所有器械物品

b.更换所有的消毒液

- c.认真学习消毒常识
- d.正确估价实际感染的控制
- e.查找污染源和设计消毒程序

正确答案□ d

题号： 7

- a.做好病人监测工作
- b.做好医生个人防护
- c.使用一次性器械和材料
- d.严格消毒措施
- e.以上都是

正确答案□ e

题号： 8

- a.消除各种传播途径，减少传播的可能性
- b.改变各种传播途径，减少传播的可能性
- c.控制各种传播途径，减少传播的可能性
- d.摸清各种传播途径，减少传播的可能性
- e.监测各种传播途径，减少传播的可能性

正确答案□ c

题号： 9

a.80%酒精

b.1%洗必泰

c.0.5%洗必泰

d.0.1%过氧乙酸

e.1%碘伏

正确答案□ c

题号： 10

a.10秒

b.20秒

c.30秒

d.60秒

e.2分钟

正确答案□ d

题号： 11

a.接诊每位病人前洗手即可

- b.接诊每位病人前后都要洗手
- c.必须戴手套，接诊后洗手
- d.带手套接诊后洗手，再换手套
- e.接诊每位病人后换手套

正确答案□ d

题号： 12

- a.化学熏蒸
- b.干热灭菌
- c.高压蒸汽
- d.表面消毒
- e.以上方法都行

正确答案□ c

答案解析：器械包需要达到完全灭菌，最好采用高压蒸汽灭菌法

题号： 13

- a.定期配制
- b.每天配制
- c.每3天配制

d.随用随配

e.以上都行

正确答案□ b

答案解析：次氯酸钠消毒液应每日制备新液